

KLIRICH®

Fiche d'évaluation du risque parodontal

Date de l'examen :

Examen : Initial De réévaluation

Nom du patient :

Age :

Facteurs de risque :

Diabète Tabac Grossesse Maladie cardio-vasculaire Héritéité défavorable Age Stress


Examen radiographique

Rechercher la présence de :

Caries Granulomes Kystes Tartre sous-gingival Surplombs Atteinte osseuse

Examen clinique


Reporter dans chaque sextant le stade correspondant



STADE	DIAGNOSTIC	SYMPTOMES	VISUALISATION
STADE 0	Dent et gencive saine	Pas de tartre Pas de saignements au sondage Pas de poches parodontales	
STADE 1	Irritations des muqueuses	Blessures - Aphtes - Ulcération - Bourrelet / œdème gingival	
STADE 2	Gingivite	Tartre : indice de plaque = 1 Saignements au sondage Pas de poches parodontales	
	Mucosite péri-implantaire Péri-implantite débutante	Perte d'attache modérée	
STADE 3	Parodontite initiale	Tartre : indice de plaque = 2 Saignements au sondage - Halitose Poches parodontales < 5 mm	
	Parodontite modérée	Tartre : indice de plaque = 2 Saignements au sondage - Halitose Poches parodontales < 7 mm Récession gingivale	
	Parodontite sévère	Tartre : indice de plaque = 2 Saignements au sondage - Halitose Poches parodontales > 7 mm Récession gingivale	
	Péri-implantite avec défauts osseux et mucco-gingivaux	Perte d'attache importante	

Décision thérapeutique

Irritations Gingivite Mucosite péri-implantaire Péri-implantite débutante Parodontite initiale
 Parodontite modérée Parodontite sévère Péri-implantite avec défauts osseux et mucco-gingivaux



Référez-vous au disque « Votre guide parodontal et chirurgical » pour sélectionner le protocole adapté

Utilisation au cabinet
Seringue disponible auprès de votre distributeur habituel



Utilisation à domicile
Stylo disponible en pharmacie*



* Uniquement sur le marché français